



# UNIVERSITÄTS KLINIKUM HEIDELBERG

Falls ohne Etikett bitte handschriftliche Angaben!

Name, Vorname, Geburts-Datum, Geschlecht, Klinik, Station/Arztpraxis

## UniversitätsKlinikum Heidelberg

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Universität Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 305  
Postfach 10 30 60  
69120 Heidelberg

Institut für Immunologie, Prof. Dr. A. Roers

## Auftrag Allgemeine Immunologie

☐ Regelleistung ☐ Wahlleistg. Arzt ☐ Adr. Privat-Patient/Selbstzahler

Datum der Probenentnahme

Telefon

Fax-Nr.

Uhrzeit der Probenentnahme

### Wichtig: Klinische Diagnose/Fragestellung/Therapie

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Namenstempel bei Ambulanzarzt/Arztpraxis  
Unterschrift und Richtigkeit der Probenentnahme  
(zwingend erforderlich)  
Befundadresse/Rechnungsadresse:

Therapie mit Komplementinhibitoren: ☐ nein ☐ Eculizumab (Soliris®) ☐ Ravulizumab (Ultomiris®) ☐ Pegcetacoplan (Aspaveli®)

aktuelle C3 Konzentration \_\_\_\_\_ g/l andere: \_\_\_\_\_

## Labor für Komplement-Diagnostik

Rohrpost-Nr. 3051 (nur intern)

Leitung: Dr. med. Jutta Schröder-Braunstein  
Lieferadresse: Universitätsklinikum Heidelberg, Institut für Immunologie, Im Neuenheimer Feld 305, Raum 220, 69120 Heidelberg  
Rückfrage: 06221-5640 26/15, Information [www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostik.143295.0.html](http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostik.143295.0.html)

Material: ☐ Serum ☐ EDTA-Plasma

gekühlt transportieren oder spätestens nach 1 Std. Serum und Plasma (vom Blutkuchen getrennt) in unbeschichteten Röhrchen tiefgefrieren.  
Einsendung von Serum und Plasma. Probenversand bitte auf Trockeneis!

☐ Komplement-Status: beinhaltet Gesamt-C-Funktion klassischer Weg/CH50 (Serum), alternativer Weg/AP-F (Serum), C3d (EDTA-Plasma), sC5b-9 (nur EDTA-Plasma)  
(empfohlen zur Eingangsuntersuchung und Verlaufskontrolle)

Einzelparameter als Protein: ☐ C1q ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ C3d  
☐ Faktor B ☐ Faktor D ☐ Faktor H ☐ Faktor I  
☐ Properdin ☐ MBL (Mannose bind. Lektin)

Einzelparameter als Funktion: ☐ CH 50 (klass. Weg) ☐ APH50 (altern. Weg) ☐ Lektinweg (Funktion)

☐ Einzelfaktoren C1-C9 nur nach tel. Rücksprache

☐ sC5b-9 nur in EDTA-Plasma

Autoantikörper: ☐ C3-Nephritis-Faktor (nur in Serum) ☐ Auto-anti-Faktor H ☐ Auto-anti-C1q ☐ Auto-anti-C1 Inhibitor

C3/C5 Inhibitor Monitoring: ☐ Hemmwirkung: beinhaltet CH50, APH50, C3d, sC5b-9, bei C3 Inhibition zusätzlich C3  
Serumkonzentration: ☐ Eculizumab (Soliris®) ☐ Ravulizumab (Ultomiris®)

weitere Spezialtests: nur nach tel. Rücksprache .....

## Labor für Molekulare Immundiagnostik

Rohrpost-Nr. 3051 (nur intern)

Leitung: Prof. Dr. med. Thomas Giese  
Lieferadresse: Im Neuenheimer Feld 305, Raum 420, 69120 Heidelberg  
Rückfrage: 06221-5640 12/24

Wir bitten um telefonische Anmeldung der Proben!

Material: ☐ Vollblut Heparin  
Probenversand bitte ungekühlt bei RT und maximal <24h nach Probenentnahme einsenden

Untersuchung: ☐ NFAT-Inhibition ☐ Genexpression spontan ☐ Diagn. Durchflusszytometrie FACS  
Genexpression induziert

13QMH\_allgImmu\_Auftragsschein\_v23